

INTISARI

Judul : Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Tingkat Reversibilitas Pasien Usia Subur dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Reversibilitas.

Latar Belakang : Survei SDKI tahun 2002-2003 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan kontrasepsi sebagai upaya pencegahan ataupun penundaan kehamilan. Banyak pasangan yang mendambakan kehadiran anak ditengah keluarga mereka, namun tidak kunjung memperoleh keturunan. Perlu pemilihan kontrasepsi yang tepat, terutama berdasarkan tingkat reversibilitasnya agar ketika menghendaki terjadinya kehamilan, dapat segera terjadi.

Tujuan : Untuk mengetahui waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh wanita usia subur (15-35 tahun) untuk dapat kembali hamil setelah berhenti menggunakan kontrasepsi hormonal dan mengetahui faktor yang berhubungan dengan tingkat reversibilitas.

Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan metode *cross sectional*. Sebanyak 40 responden terlibat dalam penelitian ini, terdiri dari 19 responden menggunakan pil, 17 responden menggunakan suntik, dan 4 responden menggunakan implant. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir identitas sampel dan kuesioner. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode statistika *one way ANOVA* dan *chi-square* dengan level signifikansi 0.05.

Hasil : Rata-rata waktu reversibilitas dari kontrasepsi hormonal berupa pil, suntik dan implant berturut-turut adalah 4,474 bulan, 8,794 bulan, dan 8,125 bulan. Hasil analisis dengan *one way ANOVA* menunjukkan ketiga waktu reversibilitas kontrasepsi hormonal tidak identik (p value 0,007) dan yang berbeda secara signifikan adalah antara pil dengan suntik (p value 0,006) dan antara pil dengan implant (p value 0,008).

Kata Kunci : Kontrasepsi Hormonal, Reversibilitas, Jangkang

ABSTRACT

Title : Influence of Hormonal Contraceptives Use In The Return of Fertility Level at Fertile Age Patient and Related Factors with Return of Fertility

Background: SDKI survey on 2002-2003 shown an increase in the use of contraceptives as prevention efforts or delay pregnancy. Many couples who crave the presence of children in their family, but was never get children. They need the right selection kinds of contraceptive, especially based on the level return of fertility that when they wanted the occurrence of pregnancy its may soon be happening.

Objectives .: To find out the average time required by the women of fertile age (15-35 years old) be able to get pregnant again after stopping hormonal contraceptives and determine related factors with incidence of obesity in members of police Polres Rejang Lebong Bengkulu province

Method : This research is analytical descriptive study with cross sectional method. 40 respondents involved in this research, Consist of 19 respondents had to use the pills, 17 respondents had to use depo , and 4 respondents had to use implants.

The instrument used in this study are form of sample identity and questioners. Data in this study were analyzed with one way ANOVA and chi-square statistical method with level of significance is 0,05

Result : the average time return of fertility of hormonal contraceptives for pills, depo, and implant are 4,474 month, 8,794 month, and 8,125 month. The result of analysis by one way ANOVA showed that each time return of fertility of hormonal contraceptives is not identic (p value 0,007) and which different significantly are between pills with depo (p value 0,006) and between pills with implant (p value 0,008).

Keyword: Hormonal Contraception, Return of Fertility, Jangkang