

Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien dengan Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah “Dr. RM. Soedjarwadi Klaten”

Elma Anggrayni
Program Studi Farmasi

INTISARI

Skizofrenia merupakan gangguan kesehatan yang terjadi secara global yang ditandai dengan gejala positif dan negatif. Kepatuhan pengobatan pada pasien skizofrenia berperan penting terhadap hasil terapi skizofrenia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan pola penggunaan antipsikotik, gambaran tingkat kepatuhan minum obat serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soedjarwadi Klaten, menggunakan metode rancangan *cross sectional* pengumpulan data menggunakan kuesioner *Medication Adherence Rating Scale* (MARS-10) yang diperoleh dari wawancara pasien skizofrenia dan data rekam medis pasien skizofrenia dengan kriteria inklusi pasien skizofrenia yang sudah stabil, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu membaca menulis dengan rentang waktu Februari hingga April 2022. Pengolahan data menggunakan metode analisis univariat dan bivariat dengan analisis statistik uji *chi square* dan *fisher's exact* menggunakan SPSS. Sebanyak 210 responden yang berpartisipasi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (65,2%), usia 19-44 (67,1%), pendidikan SMA (43,3%), pekerjaan tidak bekerja (41,0%), tingkat kepatuhan minum obat tinggi sebesar 64% dengan hasil *p value* $>0,05$ pada usia (0,327), jenis kelamin (0,641), pendidikan (0,779), pekerjaan (0,851). Kesimpulan penelitian yaitu, tidak terdapat hubungan antara karakteristik (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan) dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien rawat jalan dengan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr.RM. Soedjarwadi Klaten tahun 2022.

Kata kunci : Kepatuhan, MARS, Skizofrenia.

Analysis of Factors Affecting Adherence with Medication of Patients with Schizophrenia at the Regional Mental Hospital “Dr. RM. Soedjarwadi Klaten”

Elma Anggrayni
Pharmacy Study Program

ABSTRACT

Schizophrenia is a global health disorder characterized by positive and negative symptoms. Medication adherence in schizophrenic patients plays an important role in schizophrenia therapy, this study aims to describe the characteristics and patterns of antipsychotic use, descriptions of medication adherence and analyze the factors that influence it in schizophrenic patients at the Regional Mental Hospital Dr.RM. Soedjarwadi Klaten, using a cross sectional data collection method, collecting using a Medication Adherence Rating Scale (MARS-10) questionnaire obtained from interviews with schizophrenic patients and medical record data of schizophrenic patients with the inclusion criteria of stable schizophrenic patients, able to communicate well, able to read and write. with a time span of February to April 2022. Data processing used univariate and bivariate analysis methods with statistical analysis of chi square test and fisher's exact using SPSS. A total of 210 respondents participated mostly male (65.2%), age 19-44 (67.1%), high school education (43.3%), unemployed (41.0%), compliance level taking medication was 64% high with p value > 0.05 for age (0.327), gender (0.641), education (0.779), occupation (0.851). The conclusion of the study is that there is no relationship between characteristics (age, gender, education, occupation) with medication adherence in outpatients with schizophrenia at the Mental Hospital Dr.RM. Soedjarwadi Klaten in 2022.

Keywords: Adherence, MARS, Schizophrenia.